



Tờ Thông Tin: Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson

Cũng được biết đến như là Janssen, hoặc J&J



Thuốc này ra sao?

- Chỉ Một Liều Là Xong! Quý vị chỉ cần một liều thôi.
- Quý vị được bảo vệ hoàn toàn sau 2 tuần.
- Dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Người 16 hoặc 17 tuổi có thể được tiêm một loại thuốc khác.

Sự thật về loại thuốc ngừa này

- Có hơn 8 triệu người trong nước Mỹ đã được tiêm ngừa một cách an toàn với thuốc này.
- Cũng như các loại thuốc ngừa COVID-19 khác, thuốc này đã được FDA là cơ quan Liên Bang kiểm soát sự an toàn của thực phẩm và thuốc men, cho phép dùng.
- Cũng như các loại thuốc ngừa COVID-19 khác, thuốc đã được thí nghiệm nghiên cứu trên hàng chục ngàn người tình nguyện trong nhiều sắc dân và hoàn cảnh khác nhau và được thấy là an toàn và hiệu quả.

Các loại thuốc ngừa COVID-19 khác

Có 2 loại thuốc ngừa COVID-19 khác: Pfizer và Moderna. Hãy cho chúng tôi biết nếu cần thêm thông tin về các loại thuốc ngừa này..



Thuốc rất An toàn và Hiệu quả

Thuốc bảo vệ được những ai sau khi quý vị tiêm ngừa:

- Chính quý vị. Thuốc ngừa này giúp quý vị ít bị bệnh hoặc thậm chí thiệt mạng vì COVID-19 hơn nhiều.
- Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và những người quý vị gặp gỡ. Thuốc ngừa sẽ làm giảm bớt việc lây nhiễm cho người khác hơn nhiều.
- Cộng đồng của quý vị. Thuốc ngừa này làm giảm bớt sự lây truyền của siêu vi khuẩn. Thuốc này cũng giúp ngăn ngừa các biến thể nguy hiểm mới xuất hiện khi lây lan qua người khác.

Các phản ứng phụ có thể xảy ra

- Phản ứng thường có nhất là cánh tay bị đau nhức.
- Quý vị cũng có thể cảm thấy nhức đầu hoặc mệt mỏi trong 1 hoặc 2 ngày. Các triệu chứng này sẽ nhanh chóng biến mất.
- Một phản ứng phụ rất hiếm thấy của thuốc ngừa này là chứng đông máu. Chính phủ Liên Bang đã tạm ngưng tiêm thuốc để điều tra thêm. Chính phủ Liên Bang và các bác sĩ y tế công cộng độc lập hiện đã quyết định thuốc ngừa có nhiều lợi ích hơn là rủi ro. Nếu quý vị bị nhức đầu, đau bụng, nhức chân dữ dội hoặc khó thở trong vòng 3 tuần sau khi được tiêm ngừa, hãy liên lạc với bác sĩ. Nếu đang uống thuốc loãng máu, hãy cho bác sĩ biết trước khi được tiêm ngừa.

sccFreeVax.org/vi  2-1-1

Santa Clara County
PUBLIC HEALTH

