


Rất hiếm có các trường hợp được miễn trừ không phải tiêm ngừa COVID-19




Hãy đi tiêm ngừa cho dù quý vị có những tình trạng như sau:

- Bị dị ứng hoặc có phản ứng nghiêm trọng không liên quan đến thuốc tiêm ngừa, như là dị ứng với thực phẩm, thú nuôi, nọc độc côn trùng và các chất gây dị ứng trong môi trường
- Có tiền sử bị dị ứng với thuốc penicillin, latex, hoặc thuốc uống
- Đang hồi phục sau một cơn bệnh hoặc vừa mới có tiếp xúc với một trường hợp bệnh truyền nhiễm, kể cả COVID-19
- Hiện đang dùng thuốc trụ sinh
- Đang có thai, đang cho con bú, đang tìm cách thụ thai, hoặc có ý định tìm cách thụ thai
- Hiện trong tình trạng có hệ miễn dịch suy yếu, đặc biệt là ung thư, cấy ghép nội tạng dạng rắn, có bệnh phong thấp/tự miễn dịch và đang chạy thận nhân tạo
- Gần đây chưa đi khám sức khỏe định kỳ
- Bệnh tim
- Bệnh cao huyết áp
- Bệnh tiểu đường
- Có tiền sử bị hội chứng Guillain-Barre (GBS), vì bệnh GBS không chịu được liều thuốc tiêm ngừa COVID-19. GBS không thể kết hợp với thuốc tiêm ngừa COVID dùng kỹ thuật mRNA.



Các lý do để Trì hoãn việc tiêm ngừa COVID-19:

- Người hiện đang bị nhiễm COVID-19 và có triệu chứng nên chờ cho đến khi các triệu chứng đã khỏi và đáp ứng được các hướng dẫn về cô lập.
 - Quý vị nên nghĩ đến việc trì hoãn tiêm ngừa trong 3 tháng kể từ sau khi các triệu chứng bắt đầu hoặc sau khi quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính.
- Người hiện đang có bệnh cấp tính từ mức độ trung bình tới nghiêm trọng, cho dù có sốt hay không, nên chờ cho đến khi hồi phục không còn các triệu chứng cấp tính nữa. Điều này áp dụng cho tất cả các loại thuốc tiêm ngừa.



Các lý do để được Miễn không phải tiêm ngừa COVID-19:

- Đã từng có dị ứng nghiêm trọng với một liều thuốc tiêm ngừa COVID-19, chẳng hạn như bị sốc phản vệ.
- Đã từng có dị ứng ngay lập tức, cho dù ở mức độ nào với một liều thuốc tiêm ngừa COVID-19 trước đây, chẳng hạn như nổi mẩn đỏ/mề đay hoặc bị sưng môi.
- Được bác sĩ chẩn đoán bị dị ứng với một thành phần trong thuốc tiêm ngừa, chẳng hạn như polysorbate trong thuốc tiêm ngừa của Janssen và polyethylene glycol trong các thuốc tiêm ngừa của mRNA.
- Đã từng bị viêm cơ tim (myocarditis) hoặc viêm màng ngoài tim (pericarditis) sau khi tiêm một liều của thuốc mRNA hoặc Novavax chống COVID-19.

sccFreeVax.org/VI (408) 970-2000



Santa Clara County
PUBLIC HEALTH