

Tôi đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19



Tôi cần làm gì?

CÔ LẬP



Ở nhà ít nhất 5 ngày.

Ngày 0 là ngày các triệu chứng bắt đầu (hoặc ngày xét nghiệm COVID-19 dương tính của quý vị, nếu quý vị không có triệu chứng).

Truy cập sccgov.org/t2t để tìm hiểu về các lựa chọn điều trị.

Quý vị có các triệu chứng vào Ngày thứ 5 không?



Quý vị đã hết sốt trong 24 giờ (mà không dùng đến thuốc hạ sốt) và các triệu chứng của quý vị có nhẹ và đang cải thiện không?



Tiếp tục ở nhà...

Cho đến Ngày thứ 10 HOẶC cho đến khi quý vị hết sốt trong 24 giờ (mà không dùng đến thuốc hạ sốt) và các triệu chứng nhẹ và đang cải thiện.



Kết thúc cô lập sau Ngày thứ 5.

Đeo khẩu trang cho đến hết Ngày thứ 10 HOẶC cho đến khi quý vị thực hiện tổng cộng 2 lần xét nghiệm âm tính, cách nhau ít nhất là 1 ngày giữa các lần xét nghiệm.

Tôi đã có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19

Tôi cần làm gì?



NGƯỜI CÓ TIẾP XÚC GẦN

Quý vị có các triệu chứng không?

CÓ

Tuân theo hướng dẫn khi có TRIỆU CHỨNG.

KHÔNG



Quý vị **KHÔNG** cần phải cách ly, nhưng...

Lấy xét nghiệm 3-5 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng.
Mang khẩu trang trong 10 ngày.

Quý vị đã có xét nghiệm dương tính?

CÓ

Tuân theo hướng dẫn về CÔ LẬP.

KHÔNG



Tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Mang khẩu trang cho đến hết Ngày thứ 10.

Tôi có các triệu chứng của COVID-19

Tôi cần làm gì?



TRIỆU CHỨNG



VỀ NHÀ NGAY LẬP TỨC.

Lấy xét nghiệm và ở nhà cho đến khi quý vị nhận được kết quả của mình.

Quý vị đã có xét nghiệm dương tính?

CÓ

KHÔNG

Tuân theo hướng dẫn về CÔ LẬP.

Quý vị đã hết sốt trong 24 giờ (mà không dùng đến thuốc hạ sốt) và các triệu chứng của quý vị có nhẹ và đang cải thiện không?

CÓ

KHÔNG

Quý vị có phải là người có tiếp xúc gần?

CÓ

KHÔNG

Tiếp tục sinh hoạt bình thường của quý vị VÀ lấy xét nghiệm 3-5 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng.

Mang khẩu trang trong 10 ngày.

Tiếp tục sinh hoạt bình thường của quý vị.



Ở nhà và lấy lại xét nghiệm sau mỗi 1-2 ngày.

Quý vị không cần ở nhà nữa nếu các kết quả xét nghiệm vẫn âm tính, quý vị đã hết sốt trong 24 giờ (mà không dùng đến thuốc hạ sốt) và các triệu chứng khác nhẹ và đang cải thiện.